



Comadox 5.5%

ANTIBIÓTICO PREMEZCLA

NÚMERO DE REGISTRO: Q-7425-002

Composición cualitativa y cuantitativa

Cada 1000 g contienen:

Carbadox		55 g
Vehículo	c.b.p.	1000 g

Forma farmacéutica

Premezcla

Propiedades farmacológicas

El carbadox tiene efectos lipógenos, activa las glándulas endocrinas y mejora el aprovechamiento de proteínas. Actúa esencialmente contra bacterias grampositivas y algunas gramnegativas. Inhibe la síntesis de DNA bacteriano y destruye al DNA preexistente. Es más activo en condiciones anaerobias.

Además de ser promotor de crecimiento, tiene cierto efecto contra clamidias y protozoarios.

Especies

Porcinos (lechones).

Indicaciones

Es una premezcla específica para tratamiento de la disentería porcina y enteritis bacteriana en cerdos sensibles al carbadox.

Es eficaz contra *treponema* y *Serpulina hyodysenteriae*, *Salmonella cholerasuis*, y *Bordetella bronchiseptica* y contra clostridios.

Mejora la conversión alimenticia y la ganancia diaria de peso.

Efectos adversos

A dosis mayores de las recomendadas puede ocasionar retraso del crecimiento, heces secas, deshidratación, ingestión de la propia orina y elevado consumo de sal.



HECHO EN MÉXICO POR:

Comercializadora Agropecuaria de Degollado S.A. de C.V.
Hidalgo No. 302 Col. Santa Cecilia, C.P. 47980 Degollado, Jalisco.
Tels. 01 (345) 937 07 78, 937 10 89
Planta: Km 3 Camino a los Arrayanes
Degollado, Jalisco.



Comadox 5.5%

ANTIBIÓTICO PREMEZCLA

NÚMERO DE REGISTRO: Q-7425-002

Dosis y vía de administración

Administrar 400 g a 1 kg por tonelada de alimento durante dos semanas o hasta que el lechón alcance los 35 kg de peso.

Vía de administración: oral, mezclado con el alimento.

Advertencias

Se restringe la administración de este producto exclusivamente por vía oral en la primera etapa de desarrollo de los porcinos, hasta los 35 kg de peso; por tanto la carne de éstos animales queda prohibida para consumo humano. Posteriormente, hasta la etapa de finalización se podrá consumir la carne de estos animales. Prohibido el uso de este producto en porcinos adultos y en todas las edades de las demás especies animales destinadas para consumo humano y mascotas.

Los operadores deben utilizar googles, ropa protectora y mascarilla de seguridad durante el proceso de mezclado y manejo del alimento.

Mézclese en forma uniforme con el alimento que se va a medicar.

No usar en casos de hipersensibilidad a la sustancia activa.

Tiempo de retiro

Desde los 35 kg de peso del lechón hasta la etapa de finalización.

Conservación

Almacenar el producto en un lugar fresco y seco y no exponga el producto a la luz solar directa y constante.

Presentación

Saco de 25 kg



HECHO EN MÉXICO POR:

Comercializadora Agropecuaria de Degollado S.A. de C.V.
Hidalgo No. 302 Col. Santa Cecilia, C.P. 47980 Degollado, Jalisco.
Tels. 01 (345) 937 07 78, 937 10 89
Planta: Km 3 Camino a los Arrayanes
Degollado, Jalisco.