



Comflor premix 4%

ANTIBIÓTICO PREMEZCLA

NÚMERO DE REGISTRO: Q-7425-045

Composición cualitativa y cuantitativa

Cada 1000 g contiene:

Florfenicol	40 g
Vehículo c.b.p.	1000 g

Forma farmacéutica

Premezcla

Propiedades farmacológicas

El florfenicol es un antibiótico sintético de amplio espectro del grupo de los fenicoles, actúa por inhibición de la síntesis proteica a nivel ribosomal y es bacteriostático. Sin embargo, la actividad bactericida ha sido demostrada in vitro frente a *Pasteurella multocida* cuando el florfenicol está presente a concentraciones por encima de la CMI durante 4 a 12 horas.

Farmacocinética

Tras la administración oral a cerdos de 10 mg/kg bajo condiciones experimentales, la absorción de florfenicol fue variable pero se alcanzaron concentraciones máximas en suero de aproximadamente 5 µg/ml, 3 horas tras la dosis.

La semivida de eliminación fue de entre 3 y 4 horas. Cuando a los cerdos se les proporcionó libre acceso, durante 5 días, a pienso medicado para porcino a la dosis recomendada de 10 mg/kg, las concentraciones séricas de florfenicol fueron superiores a 1 µg/ml durante más de 16 horas cada día de tratamiento.

El florfenicol se absorbe bien cuando se administra vía oral y tras su distribución se excreta rápidamente en la orina y heces en una proporción de 3:1. Una fracción se elimina inalterada y el resto se metaboliza en 5 metabolitos fundamentales.

Especies

Porcinos.



HECHO EN MÉXICO POR:

Comercializadora Agropecuaria de Degollado S.A. de C.V.
Hidalgo No. 302 Col. Santa Cecilia, C.P. 47980 Degollado, Jalisco.
Tels. 01 (345) 937 07 78, 937 10 89
Planta: Km 3 Camino a los Arrayanes
Degollado, Jalisco.



Comflor premix 4%

ANTIBIÓTICO PREMEZCLA

NÚMERO DE REGISTRO: Q-7425-045

Indicaciones

Está indicado para el control y tratamiento de las enfermedades respiratorias de los cerdos, asociadas con patógenos susceptibles al florfenicol, *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Pasteurella spp.*, *Salmonella spp.* y *E. coli*.

Efectos adversos

Los efectos adversos más frecuentes son diarrea, inflamación perianal y eversión rectal. También se puede observar un incremento del calcio en suero. Estos efectos son transitorios, resolviéndose al cesar el tratamiento.

Dosis y vía de administración

Administrar 500 a 1000 g por tonelada de alimento (equivalente a 10 - 20 mg de florfenicol por Kg de peso vivo por día), durante 5 días consecutivos.

Vía de administración: oral, mezclado con el alimento.

Advertencias

No usar en casos de hipersensibilidad a la sustancia activa.

Tiempo de retiro

Porcinos: 14 días.

Conservación

Consérvese en un lugar fresco y seco.

Presentación

Bolsa con 1 kg
Cubeta con 5 kg
Cubeta con 10 kg
Saco de 20 kg
Saco de 25 kg



USO VETERINARIO
CONSULTA AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.

HECHO EN MÉXICO POR:

Comercializadora Agropecuaria de Degollado S.A. de C.V.
Hidalgo No. 302 Col. Santa Cecilia, C.P. 47980 Degollado, Jalisco.
Tels. 01 (345) 937 07 78, 937 10 89
Planta: Km 3 Camino a los Arrayanes
Degollado, Jalisco.