FICHA TÉCNICA

Comparto

HORMONAL INYECTABLE

NÚMERO DE REGISTRO: Q-7425-010

Composición cualitativa y cuantitativa

Cada ml contiene:

Oxitocina sintética USP	20 UI
Vehículo c.b.p.	1 ml

Forma farmacéutica

Solución inyectable

Propiedades farmacologicas

La oxitocina es una hormona originada en el lóbulo anterior de la hipófisis, obtenida sintéticamente. Actúa estimulando selectivamente la actividad motora del útero, aumentando las contracciones y el tono. La respuesta uterina a la hormona está afectada por la acción de las hormonas sexuales femeninas; refuerza la motilidad uterina si el órgano está dominado por los estrógenos. También causa la contracción de las células mioepiteliales de los acinos mamarios, provocando la eyección de la leche.

Tras la administración parenteral se absorbe rápidamente y se une parcialmente a proteínas del plasma. Se metaboliza rápidamente en el organismo por la acción de la oxitocinasa, presente en el suero sanguíneo durante la gestación (formada en placenta) y tejidos (especialmente hígado y riñón), siendo sus efectos rápidos y pasajeros.
La vida media en sangre es de 2-3 minutos. Se elimina por orina y, en animales en lactación, también por la glándula mamaria.

Especies

Porcinos (reproductores), bovinos (productores de leche), ovinos (productores de carne), caprinos (productores de leche) y caninos.

Indicaciones

Coadyuvante en los trabajos de parto, durante la lactancia en el mejoramiento de la secreción de leche o en el tratamiento de la metritis.

En todas las especies está indicado para: ›››

HECHO EN MÉXICO POR:
Comercializadora Agropecuaria de Degollado S.A. de C.V.
Hidalgo No. 302 Col. Santa Cecilia, C.P. 47980 Degollado, Jalisco.
Tels. 01 (345) 937 07 78, 937 10 89
Planta: Km 3 Camino a los Arrayanes
Degollado, Jalisco.

Comadsa

Comparto

HORMONAL INYECTABLE

NÚMERO DE REGISTRO: Q-7425-010

Efectos adversos

En muy raras ocasiones pueden presentarse reacciones alérgicas.
En caso de sobredosificación, puede ocurrir hiperestimulación del miometrio, espasmo de miometrio, prematura separación de la placenta, bradicardias y arritmias e incluso la muerte de madre y feto.

Pueden presentarse hemorragias post-parto, que se tratarían sintomáticamente. Puede originar muerte fetal.

Dosis y vía de administración

Bovinos (productores de leche): 3 ml (20-60 UI), IM-SC. Durante 3 días.

Porcinos (reproductores): 2 ml (5-50 UI), IM. Dosis única o durante 2-3 días.

Ovinos (productores de carne) y caprinos (productores de leche): 1-2 ml (10- 30 UI), IM. Dosis única o durante 2-3 días.

Caninos 0.5 a 1 ml. (5-20 UI), IM-IV. Dosis única.

Advertencias

No usar en animales que presenten hipersensibilidad a la sustancia activa y/o a alguno de los excipientes.
No usar en hembras con predisposición a ruptura uterina.

No usar cuando no exista dilatación del cuello uterino (en la inducción al parto).

Tiempo de retiro

Carne: Cero días.
Leche: cero días.

HECHO EN MÉXICO POR:
Comercializadora Agropecuaria de Degollado S.A. de C.V.
Hidalgo No. 302 Col. Santa Cecilia, C.P. 47980 Degollado, Jalisco.
Tels. 01 (345) 937 07 78, 937 10 89
Planta: Km 3 Camino a los Arrayanes
Degollado, Jalisco.

Comadsa

Comparto

HORMONAL INYECTABLE

NÚMERO DE REGISTRO: Q-7425-010

Conservación

Consérvese en un lugar fresco y seco.

Presentación

Frasco con 20 ml
Frasco con 50 ml
Frasco con 100 ml
Frasco con 250 ml
Frasco con 500 ml

USO VETERINARIO
CONSULTA AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.

HECHO EN MÉXICO POR:
Comercializadora Agropecuaria de Degollado S.A. de C.V.
Hidalgo No. 302 Col. Santa Cecilia, C.P. 47980 Degollado, Jalisco.
Tels. 01 (345) 937 07 78, 937 10 89
Planta: Km 3 Camino a los Arrayanes
Degollado, Jalisco.

Comadsa